



Associazione per l'assistenza  
sanitaria integrativa ai lavoratori  
delle aziende del Gruppo Telecom Italia

Ferdinando di Orio

Carlo Nucci

**Indagine Medicina Preventiva Oculistica  
in Età Pediatrica (I-MPOEP)  
RISULTATI DEL PROGETTO ASSILT**

EDIZIONI  
**L Una**



**Vincenza Cofni, Maria Rosita Cecilia, Carlo Nucci**  
*La valutazione ortottica*


### Valutazione ortottica

Su 10622 cartelle analizzate, la valutazione ortottica risultava "non eseguibile" in 708 soggetti (6.7%), senza alcuna associazione con il genere o con l'età dei pazienti. La valutazione dei riflessi corneali è stata eseguita in 10490 esami per vicino (98.8%) e 10499 esami per lontano (98.8%).

L'esame delle deviazioni oculari<sup>o</sup> senza lenti è stato eseguito nel 99% dei soggetti.

La misurazione invece delle deviazioni oculari per vicino e per lontano con lenti è stata pari al 91%. L'esecuzione dell'esame delle deviazioni oculari con lenti non è associato al genere, ma all'età ( $p=0,000$ ): all'aumentare dell'età aumenta la percentuale di esami effettuati (Fig. 33).

Figura 33 - Deviazioni oculari con lenti (%)



Nelle tabelle che seguono, sono riportate le distribuzioni percentuali degli esami eseguiti tra i partecipanti dei vari centri afferenti alle diverse Regioni italiane.